

# OPTOidro+<sup>®</sup>A <sup>(I)</sup> monodose

Soluzione oftalmica sterile a base di Ipromellosa ed aminoacidi

15 monodose da 0,35 ml - Senza conservanti

## Composizione

Ipromellosa	0,300 g
L-prolina	0,0752 g
L-glicina	0,100 g
L-lisina cloridrato	0,014 g
L-leucina	0,0108 g

Soluzione isotonica tamponata a pH 7,2 q.b. a 100 ml

## Descrizione

**OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** è una soluzione oftalmica sterile a base di Ipromellosa ed aminoacidi.

L'Ipromellosa è un polimero che ha la proprietà di addensare e stabilizzare il film lacrimale sulla superficie della cornea creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico. Gli aminoacidi L-prolina, L-glicina, L-lisina cloridrato e L-leucina, contenuti nel prodotto, aumentano la lubrificazione della superficie oculare e possono contribuire al miglioramento della protezione degli epitelii sottoposti a stress di varia natura.

**OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare, procurando per lungo tempo sollievo dai disturbi (bruciore, sensazione di secchezza o di corpo estraneo ecc) causati dalla sindrome dell'occhio secco o dagli agenti irritanti ambientali (inquinamento atmosferico ecc), visivi (forte impegno della vista ecc) e meccanici (lenti a contatto ecc). L'assenza di conservanti nella soluzione contribuisce ad aumentare la sicurezza di impiego del prodotto e a renderlo indicato anche nei portatori di lenti a contatto.

## Indicazioni

Integratore per il film lacrimale, idratante e lubrificante per il trattamento dei disturbi oculari da insufficienza lacrimale, da stress ambientale, visivo e meccanico.

# OPTOidro+<sup>®</sup>A <sup>(ES)</sup> monodose

Solución oftálmica estéril a base de hipromelosa y aminoácidos.

15 monodosis de 0,35 ml - Sin conservantes

## Composición

Hipromelosa	0,300 g
L-prolina	0,0752 g
L-glicina	0,100 g
L-lisina cloridrato	0,014 g
L-leucina	0,0108 g

Solución isotónica tamponada a pH 7,2 c.s.p. 100 ml

## Descripción

**OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** es una solución oftálmica estéril a base de hipromelosa y aminoácidos.

La hipromelosa es un polímero que tiene la propiedad de adensar y estabilizar la película lagrimal en la superficie de la córnea creando un escudo protector, transparente y viscoelástico. Los aminoácidos L-prolina, L-glicina, L-lisina cloridrato y L-leucina, contenidos en el producto, aumentan la lubricación de la superficie ocular y pueden contribuir a la mejoría de la protección de los epitelios sometidos a tensiones de diferente naturaleza.

**OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** protege, humidifica y lubrica la superficie ocular, aportando durante mucho tiempo alivio de las molestias (escozor, sensación de sequedad o de cuerpo extraño, etc.) causadas por el síndrome del ojo seco o por los agentes irritantes ambientales (contaminación atmosférica, etc.), visuales (gran esfuerzo de la vista, etc.) y mecánicos (lentes de contacto, etc.). La ausencia de conservantes en la solución contribuye a aumentar la seguridad de uso del producto y lo hace indicado incluso para usuarios de lentes de contacto.

## Indicaciones

Integrador para la película lagrimal, hidratante y lubricante para el tratamiento de las molestias oculares producidas por insuficiencia lagrimal y tensión ambiental, visual y mecánica.

# OPTOidro+<sup>®</sup>A <sup>(P)</sup> monodose

Solução oftálmica estéril à base de Hipromelose e aminoácidos.

15 doses únicas de 0,35 ml - Sem conservantes

## Composição

Hipromelosa	0,300 g
L-prolina	0,0752 g
L-glicina	0,100 g
Cloridrato de L-lisina	0,014 g
L-leucina	0,0108 g

Solução isotónica tamponada a pH 7,2 suficiente para 100 ml

## Descrição

O **OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** é uma solução oftálmica estéril à base de Hipromelose e aminoácidos. O Hipromelose é um polímero que tem a capacidade de adensar e estabilizar a película lacrimal na superfície da córnea, criando um escudo protetivo transparente e viscoelástico. Os aminoácidos L-prolina, L-glicina, cloridrato de L-lisina e L-leucina, contidos no produto, aumentam a lubrificação da superfície ocular e podem contribuir para melhorar a proteção dos epitélios submetidos a tensões de vários tipos. **OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** protege, humidifica e lubrifica a superfície ocular, proporcionando um alívio prolongado dos distúrbios (queimação, sensação de seca ou de corpo estranho, etc) provocados pela síndrome do olho seco ou pelos agentes irritantes ambientais (poluição atmosférica, etc.), visuais (uso prolongado da vista, etc) e mecânicos (lentes de contato, etc). A ausência de conservantes na solução contribui para aumentar a segurança de utilização do produto e também para torná-lo indicado para quem utiliza de lentes de contato.

## Indicações

Integrador para película lacrimal, hidratante e lubrificante para o tratamento de distúrbios oculares provocados pela insuficiência lacrimal e pelo stress ambiental, visual e mecânico.

## Modalità d'uso

Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 2 - 3 volte al giorno o più, secondo necessità.

Il prodotto può essere instillato nell'occhio anche quando si indossano lenti a contatto o sulla superficie interna della lente a contatto prima della sua applicazione.

## Istruzioni per l'uso

Separare un contenitore monodose dalla stecca.

Aprirlo ruotando il cappuccio su se stesso.

Applicare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale

Gettare il minicontenitore anche se residua del contenuto.

## Controindicazioni

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

## Precauzioni ed Avvertenze

- Non utilizzare il prodotto se il contenitore è danneggiato
- Per eliminare il rischio di contaminazione della soluzione, evitare che il contenitore entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti

- OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** è solo per uso oftalmico esterno

- Il prodotto deve essere usato subito dopo l'apertura del minicontenitore. Utilizzare una sola volta e gettare il contenitore monodose con il contenuto residuo.

- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla monodose

- Non conservare al di sopra di 25°C

- In caso di somministrazione di soluzioni oftalmiche a scopo curativo consultare il medico

- Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini

- Non usare in caso di infezione agli occhi.

## Effetti collaterali

Non sono stati riportati effetti indesiderati dopo somministrazione del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico.

Dopo l'applicazione del prodotto può risultare un lieve e passeggero offuscamento visivo.

## Indicaciones de uso

Instalar 1-2 gotas en la bolsa conjuntival 2-3 veces al día o más, según la necesidad. El producto se puede instilar en el ojo incluso cuando se llevan lentes de contacto o en la superficie interna de la lente de contacto antes de su aplicación.

## Modo de empleo

Separar un envase monodosis de la tira.

Abrir girando el capuchón sobre sí mismo.

Aplicar 1-2 gotas en la bolsa conjuntival.

Desear el envase monodosis aunque quede contenido.

## Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida hacia componentes del producto u otras sustancias estrictamente relacionadas desde el punto de vista químico.

## Precauciones y advertencias

- No utilizar el producto si el recipiente está dañado.

- Para eliminar el riesgo de contaminación de la solución, evitar que el recipiente entre en contacto con el ojo o con otros objetos.

- OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** es únicamente para uso oftálmico externo.

- El producto se debe utilizar inmediatamente después de la apertura del envase monodosis. Utilizar una sola vez y desechar el envase monodosis con el contenido restante.

- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase monodosis.

- Mantener la temperatura por debajo de los 25°C.

- En caso de administración de soluciones oftálmicas para fines curativos, consultar con el médico.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- No usar en caso de infección en los ojos.

## Efectos adversos

No se ha informado de efectos adversos después de la administración del producto. En caso de reacciones adversas, suspender el uso del producto y consultar con un médico. Después de la aplicación del producto, se puede producir un ofuscamiento visual leve y pasajero.

## Modo de usar

Aplicar 1-2 gotas no sacco conjuntival 2-3 vezes por dia, ou mais, de acordo com a necessidade. O produto pode ser aplicado no olho mesmo quando estiver a utilizar lentes de contacto ou sobre a superfície interior da lente de contacto antes de a aplicar.

## Instruções para o uso

Separar um recipiente de dose única da tira.

Para abrir, basta girar a tampa.

Aplicar 1-2 gotas no sacco conjuntival.

Deitar o recipiente fora, mesmo se ainda estiver algum conteúdo residual.

## Contraindicações

Hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto ou a outras substâncias afins do ponto de vista químico.

## Precações e Advertências

- Não usar o produto caso o recipiente esteja danificado

- Para eliminar o risco de contaminação da solução, evitar que o recipiente entre em contato com o olho ou com outros objetos

- OPTOidro+<sup>®</sup>A monodose** somente é indicado para uso oftálmico externo

- O produto deve ser utilizado apenas após a abertura do mini-recipiente. Utilizar apenas uma vez e deitar fora o recipiente de dose única com o conteúdo residual.

- Não utilizar o produto após a data de vencimento indicada na embalagem

- Não conservar acima de 25°C

- Em caso de subministração de soluções oftálmicas para fins curativos, consultar um médico.

- Manter fora do alcance de crianças.

- Não usar em caso de infecção nos olhos.

## Efeitos colaterais

Não foram verificados efeitos indesejados após a subministração do produto. Em caso de reações adversas, suspender o uso do produto e consultar um médico. Após a aplicação do produto, pode ocorrer um ofuscamento da visão ligeiro e passageiro.